

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

ARBO. VITI. RHONE-ALPES

ABONNEMENT ANNUEL: 110f

REGISSEUR RECETTES D.D.A.F.



RÉGION RHÔNE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03

19 Septembre 1986

N° de série continue 325

Bulletin n° 16

MALADIES DE CONSERVATION, TAVELURES : protégez les fruits jusqu'à la récolte

CARPOCAPSE : fin de la protection sur une partie de la région

BACTERIOSES (pêchers, cerisiers) : n'oubliez pas les traitements au cuivre durant l'automne

POMMIERS - POIRIERS

Tavelures - Attention aux contaminations avant la récolte, protégez les fruits à l'aide de fongicide de contact à action préventive. Renouvelez l'application lorsque la pluviométrie atteint 25 mm.

Maladies de conservation -

- 1er traitement 3 semaines avant récolte
- 2e traitement 3 jours avant récolte, si aucun trempage n'est envisagé en station, avec l'un des produits suivants :

bénomyl
carbendazime
thiophanate méthyl

Ces produits sont également actifs contre les tavelures.

Carpocapse -

Situation : les éclosions larvaires sont terminées sur l'ensemble de la région depuis le début du mois de septembre.

Toutefois, des risques subsistent dans les noyeraies de l'Isère et dans le secteur de Chagnon (42).

Préconisation : la protection est à maintenir uniquement dans ces deux situations.

Tordeuse Orientale -

Le vol se poursuit dans la Drôme, l'Ardèche et la Loire (Véranne). Protégez les vergers à proximité des pêchers.

PECHERS

Dépérissement Bactérien -

Objectif : réduire l'inoculum bactérien au cours de l'automne.

Préconisations : réalisez 4 à 5 pulvérisations cupriques pendant la chute des feuilles à raison de 125 g de cuivre métal par hectolitre.

Premier traitement à la chute des premières feuilles, les suivants seront espacés de 10 à 12 jours maximum.

Afin de diminuer les effets dépressifs du cuivre, effectuez les applications sur une végétation sèche. Un bon aoûtement limite également les risques.

CERISIERS

Bactériose -

Deux à trois applications cupriques (200 g de cuivre métal/hl) sont nécessaires durant la chute des feuilles.

Intervalle entre deux traitements : 15 jours maximum.



LA SÉSIE DU POMMIER



Sésie adulte (papillon) ; envergure 2 cm. Cliché ENITAH



Piégeage alimentaire.



Piégeage sexuel : capsule à phéromones (1), mâles englués (2)



Chenille ; taille au dernier stade larvaire : 25 mm. Durée de vie : 1 à 2 ans selon les régions.



Galeries superficielles creusées par les chenilles sous l'écorce.

Cliché ENITAH



Site d'attaque préférentiel en jeune plantation (collets, racines adventives). Noter la présence de sciure sur le sol. Cliché ENITAH



Dépouille nymphale ; leur nombre en fin d'été permet d'estimer le niveau des populations.

7563